

核准日期：2007.03.28

修改日期：2010.10.01

修改日期：2015.01.08

修改日期：2015.12.01

胞磷胆碱钠氯化钠注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：胞磷胆碱钠氯化钠注射液

商品名称：欧迈

英文名称：Citicoline Sodium and Sodium Chloride Injection


汉语拼音：Baolindanjianna Lühuana Zhushēyē

【成份】

主要成份：胞磷胆碱钠，氯化钠

化学名称：胆碱胞嘧啶核苷二磷酸酯的单钠盐。

化学结构式：



分子式：C₁₄H₂₅N₄NaO₁₁P₂；NaCl；分子量：510.31；58.5

【性状】本品为无色澄明液体。

【适应症】用于急性颅脑外伤及脑手术后的意识障碍。

【规格】（1）100ml：胞磷胆碱钠 0.25g 与氯化钠 0.9g；

（2）100ml：胞磷胆碱钠 0.5g 与氯化钠 0.9g。

【用法用量】静脉滴注。每次 0.25~0.5g，每日一次，缓慢滴注。5~10 日为一疗程。

【不良反应】

全身：偶见发热、倦怠、过敏样反应，严重者有过敏性休克的报告。

心血管系统：偶见暂时性血压下降、心动过缓和心动过速。

消化系统：偶见恶心、呕吐、食欲不振、胃痛、胃烧灼感、腹泻和肝功能异常。

呼吸系统：有发生过敏性哮喘的报告，严重者可出现呼吸困难和喉水肿。

神经系统：偶见眩晕、震颤、头痛、失眠、兴奋、烦躁不安和痉挛。

皮肤五官：偶见皮疹及一过性复视。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 有药物过敏史的患者慎用；
2. 对伴有脑出血、脑水肿和颅压增高的严重急性颅脑损伤患者慎用；
3. 癫痫及低血压患者慎用；
4. 本品为含钠制剂，请低钠者应用时注意。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇及哺乳期妇女用药的安全有效性尚未确立。孕妇及哺乳期妇女慎用。

【儿童用药】根据病情和年龄适当调整剂量。

【老年用药】根据病情和年龄适当调整剂量。

【药物相互作用】

本品用于震颤麻痹病人时，不宜与左旋多巴合用，否则可引起肌僵直恶化。

【药物过量】

用量过大，可能有恶心、呕吐、食欲不振、头痛、失眠、兴奋、痉挛等症状，可减量，并对症处理。

【药理毒理】

胞磷胆碱为核苷衍生物，可增强脑干网状结构、尤其是与意识密切相关的上行网状结构激动系统的机能；增强椎体系统的机能，改善运动麻痹；改善大脑循环，通过减少大脑血流阻力，增加大脑血流而促进大脑物质代谢，对促进大脑功能恢复和促进苏醒等具有一定作用。

【药代动力学】

本品注射后血药浓度迅速下降，30 分钟降至注入时的 1/3，1~2 小时基本稳定，分布以肝内最多，占 10%。在肝脏代谢为游离胆碱和胞苷二磷酸，主要经肾脏和肺清除，原药半衰期为 3.5 小时，主要代谢物胆碱的清除半衰期为 2 小时。本品较难通过血脑屏障，进入脑内的药物很少，仅占 0.1%，但药物在脑内停留时间很长，注射后 3 小时内药物浓度达峰值，并在 24 小时内保持不变；而且损伤脑比正常脑、受损半球比未受损半球的胞磷胆碱含量明显升高。

【贮藏】遮光，密闭保存。

【包装】100ml 玻璃输液瓶，1 瓶/盒。

【有效期】18 个月。

【执行标准】中国药典 2015 年版二部。

【批准文号】（1）100ml：胞磷胆碱钠 0.25g 与氯化钠 0.9g 国药准字 H20030505；

（2）100ml：胞磷胆碱钠 0.5g 与氯化钠 0.9g 国药准字 H20051582。

【生产企业】



企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2166666

传真号码：0533-2184991

网址：www.xhzy.com

30106061C

