



## 阿司匹林肠溶片使用说明书

请仔细阅读说明书并按说明书使用或在药师指导下购买和使用

### 【药品名称】

通用名称：阿司匹林肠溶片

英文名：Aspirin Enteric-coated Tablets

【成份】：阿司匹林

【形状】本品为白色肠溶包衣片，除去包衣后显白色。

【作用类别】本品为解热镇痛类非处方药药品。

### 【适应症】

用于普通感冒或流行性感引起的发热。也用于缓解轻至中度疼痛，如头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛、痛经及关节痛等。

【规格】0.3g

### 【用法用量】

整片吞服，成人一次1片，若发热或疼痛持续不缓解，可间隔4-6小时重复用药一次。24小时内不超过4片。儿童用药请咨询医师或药师。

### 【不良反应】

1.按规定剂量服用很少引起胃肠道不良反应。

2.少见或罕见的有

- (1) 支气管痉挛性过敏反应，表现为呼吸短促、呼吸困难或哮喘、胸闷。
- (2) 皮肤过敏反应，表现为皮疹、荨麻疹、皮肤瘙痒等。
- (3) 血尿、眩晕和肝脏损害。

### 【禁忌】

1.孕妇、哺乳期妇女禁用。

2.哮喘、鼻息肉综合征、对阿司匹林和其他解热镇痛药过敏者禁用。

3.血友病或血小板减少症、溃疡病活动期患者禁用。

### 【注意事项】

- 1.本品为对症治疗药，用于解热连续使用不超过3天，用于止痛不超过5天，症状未缓解请咨询医师或药师。
2. 本品易于通过胎盘，并可由乳汁分泌，故妊娠期、哺乳期妇女禁用。
3. 体温在40℃以上患者，应在医师指导下使用。
4. 年老体弱患者应在医师指导下使用。
5. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。
6. 痛风、肝肾功能减退、心功能不全、鼻出血、月经过多以及有溶血性贫血史的患者慎用。
7. 发热伴脱水的患儿慎用。
8. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 儿童必须在成人监护下使用。

### 【药物过量】

过量中毒表现：

- (1) .轻度，即水杨酸反应，多见于风湿病用本品治疗者，表现为头痛、头晕、耳鸣、耳聋、

恶心、呕吐、腹泻、嗜睡、精神紊乱，多汗、呼吸深快、烦渴、手足不自主运动（多见于老年人）及视力障碍等；

（2）.重度，可出现血尿、抽搐、幻觉、重症精神紊乱，呼吸困难及无名热等；

（3）儿童患者精神及呼吸障碍更明显。

**【贮藏】**

避光，密封在干燥处保存。

**【包装】**

100片/瓶，塑料瓶包装；12片/板，铝塑泡罩包装。

**【有效期】**一年半

**【批准文号】**H37020333

**【生产企业】**：山东新华制药股份有限公司

地址：山东省淄博市张店区东一路14号

电话：0533-2184223