

肾上腺色腓注射液说明书

【药品名称】


通用名：肾上腺色腓注射液

汉语拼音：Shenshangxiansezong Zhusheye

英文名：Carbazochrome Injection

化学名：3-羟基-1-甲基二氢吲哚-5,6-二酮缩氨脲。

结构式：



分子式：C₁₀H₁₂N₄O₃

分子量：236.23

【性状】本品为桔红色的澄明液体。

【药理毒理】

为肾上腺素的氧化产物肾上腺色素的缩氨脲水杨酸盐，能增强毛细血管对损伤的抵抗力，稳定血管及其周围组织中的酸性粘多糖，降低毛细血管的通透性，增强受损毛细血管端的回缩作用，使血块不易从管壁脱落，从而缩短止血时间，但不影响凝血过程。

【适应症】适用于因毛细血管损伤及通透性增加所致的出血，如鼻衄、视网膜出血、咯血、胃肠出血、血尿、痔疮及子宫出血等。也用于血小板减少性紫癜，但止血效果不十分理想。

【用法用量】肌内注射：一次5~10mg（1~2支），一日2~3次，严重出血一次用10~30mg（2~4支），每2-4小时一次。

【不良反应】本品毒性低，可产生水杨酸样反应，如恶心、呕吐、头晕、耳鸣、视力减退等。对癫痫病人可引起异常脑电活动。注射部位有痛感。

【禁忌】对水杨酸过敏者禁用。有癫痫病史及精神病史的患者慎用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚不明确。

【儿童用药】小儿小于 5 岁剂量减半，大于 5 岁同成人。

【药物相互作用】

抗组胺药、抗胆碱药的扩血管作用可影响本品的止血效果，如合并用药应加大本品剂量。忌与四环素类药物在同一溶液内给药。

【药物过量】大量使用者可引起精神紊乱，并易引起水杨酸样反应。

【规格】

(1) 1ml: 5mg (2) 2ml: 10mg

【贮藏】遮光，密闭保存。

【包装】1ml 安瓶，10 支/盒；2ml 安瓶，10 支/盒

【有效期】二年

【批准文号】 (1) 1ml: 5mg 国药准字 H37020627

(2) 2ml: 10mg 国药准字 H37020626

【生产企业】 山东新华制药股份有限公司

地 址：山东省淄博市张店区东一路 14 号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2184223

网 址：www.xhzy.com