


山东鲁信天一印务有限公司					
制版号	20C-11-112		日期	2020.11.16	
客户签字	 马明华 2020.11.16				
请对此稿内容进行确认：文字\尺寸\版式\颜色\条码\电子监管码					
电子监管码	条码长度(mm)		条码高度(mm)		
材质	300G灰底白板				
成品尺寸	152×80×15mm		对此制版是否有改动意见 ☐ 有 ☐ 无		
产品名称	复方氨林巴比妥注射液2ml10支小盒			校对	王文霞
客户名称	山东新华			制作	初永美



山东新华制药股份有限公司
SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

复方氨林巴比妥注射液

码上放心·追溯码

用手机淘宝扫码查询

电话查询: 010-95001111



81544950544686901665

生产日期:
产品批号:
有效期至:

核准日期: 2007.03.28
修改日期: 2011.05.31
修改日期: 2020.12.01

复方氨林巴比妥注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
严禁用于食品和饲料加工

【药品名称】

通用名称: 复方氨林巴比妥注射液

英文名称: Compound Aminophenazone and Barbitol Injection

汉语拼音: Fufang Anlinbabituo Zhusheye

【成份】

本品为复方制剂,其组分为:每2ml(支)含氨基比林0.1g,安替比林40mg,巴比妥18mg。

辅料:依地酸二钠。

【性状】

本品为无色或微黄色的澄明液体。

【适应症】

主要用于急性高热时的紧急退热,对发热时的头痛症状也有缓解作用。

【规格】

复方制剂。

【用法用量】

肌肉注射。

成人一次2ml(1支),或遵医嘱。在监护情况下极量为一日6ml(3支)。

小儿2岁以下一次0.5~1ml($\frac{1}{4}$ ~ $\frac{1}{2}$ 支),2~5岁一次1~2ml($\frac{1}{2}$ ~1支),大于5岁一次2ml(1支)。

本品不宜连续使用。

【不良反应】

1.过敏反应休克,表现为胸闷、头晕、恶心呕吐、血压下降、大汗淋漓等症状,应立即停药并抢救。

2.粒细胞缺乏,紫癜,有时急性起病。

3.皮疹、荨麻疹、表皮松懈症等。

【禁忌】

对吡唑酮类或巴比妥类药物过敏者,及用本品有过敏史者严禁使用。

【注意事项】

1.肌肉注射前应向病人询问是否有吡唑酮类或巴比妥类药物过敏史,有过敏史者应避免使用本品,过敏性体质者亦应慎用。

2.不得与其他药物混合注射。

3.长期使用可引起粒细胞减少、再生障碍性贫血及肝肾损害等严重中毒反应。

4.呼吸系统有严重疾病及呼吸困难者慎用本品。

5.体弱者慎用。

6.本品仅对症治疗,在解除高热症状后对因治疗,在应用本品无明显效果时应改用其他方法治疗,避免盲目大量应用本品。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚不明确。

【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】老年患者的肾功能有一定程度的生理性减退,应采用较小治疗量。

【药物相互作用】

巴比妥有抑制呼吸中枢作用,对能抑制呼吸的药物有加强作用,如硫酸庆大霉素等,应禁止同时应用。

【药物过量】

未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】

本品为解热镇痛药。氨基比林和安替比林同属于吡唑酮类解热镇痛药,能抑制下视丘前列腺素的合成和释放,恢复体温调节中枢感受神经元的正常反应性而起退热作用,同时还通过抑制前列腺素等的合成而起镇痛作用。氨基比林并能抑制炎症局部组织中前列腺素的合成和释放,稳定溶酶体膜,影响吞噬细胞的吞噬作用而引起抗炎作用。合用巴比妥,可加强镇痛作用。

【药代动力学】

氨基比林 $t_{1/2}$ 为1~4小时,大部分在肝内去甲基成为4-氨基安替比林,再经乙酰化变成N-乙酰氨基安替比林,自尿中排出。

安替比林 $t_{1/2}$ 约12小时,肝中代谢降解,与葡萄糖醛酸结合在尿中排出,约5%为原形从尿中排出。

【贮藏】遮光,密闭保存。

【包装】2ml安瓿,10支/盒。

【有效期】24个月。

【执行标准】国家药监局标准WS-10001-(HD-1327)-2003。

【批准文号】国药准字H37023824

【生产企业】

企业名称: 山东新华制药股份有限公司

生产地址: 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号

邮政编码: 255086

电话号码: 0533-2196361

传真号码: 0533-2196365

网 址: www.xhzy.com

【药品上市许可持有人】

企业名称: 山东新华制药股份有限公司

注册地址: 淄博市高新技术产业开发区化工区

邮政编码: 255000

电话号码: 0533-2166666

传真号码: 0533-2184991

网 址: www.xhzy.com

2ml: 氨基比林0.1g, 安替比林40mg, 巴比妥18mg · 10支

【贮藏】遮光,密闭保存。
【适应症】:【用法用量】:【不良反应】:【禁忌】:【注意事项】等详见说明书。
【性状】本品为无色或微黄色的澄明液体。
辅料为依地酸二钠。
本品为复方制剂,其组分为:每2ml(支)含氨基比林0.1g,安替比林40mg,巴比妥18mg。