

核准日期：2007.03.28

修改日期：2008.03.28

苦参素氯化钠注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：苦参素氯化钠注射液

商品名称：派蒙


英文名称：Matrine and Sodium Chloride Injection

汉语拼音：Kushensu Lùhuana Zhushēyē

【成份】

主要成份：苦参素，氯化钠。辅料：乳酸。

化学名称：氧化苦参碱



化学结构式：

分子式： $C_{15}H_{24}N_2O_2 \cdot H_2O$ ；分子量：282.38；58.5

【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。

【适应症】用于慢性乙型病毒性肝炎的治疗。

【规格】100ml：苦参素（按氧化苦参碱计）0.6g 与氯化钠 0.9g

【用法用量】

静脉滴注。每日一次，每次 0.6g（1 瓶），两个月为一疗程，或遵医嘱。

【不良反应】患者对本品有较好的耐受性，不良反应发生率较低。常见的不良反应有头晕、恶心、呕吐、口苦、腹泻、上腹不适或疼痛，偶见皮疹，胸闷，发热，症状一般可自行缓解。个别病人可出现注射部位发红。

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 请在医生指导下使用本品。
2. 严重肾功能不全者，不建议使用本品。
3. 肝功能衰竭者慎用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇不宜使用。哺乳期妇女慎用。

【儿童用药】尚无儿童用药经验。

【老年用药】减量或遵医嘱。

【药物相互作用】尚不明确。

【药物过量】目前尚未见药物过量特殊体征和症状。若发生药物过量，要对患者进行监护，给予常规支持疗法。

【药理毒理】药理作用：本品能降低乙型肝炎病毒（DHBV）感染鸭血清 DHBV-DNA 水平，对 CCl_4 和 D-半乳糖胺所致的小鼠中毒性肝损伤具有保护作用。

【药代动力学】静脉注射苦参素后，血药浓度-时间曲线呈双指数型，符合二房室模型。本药主要在肝脏及小肠中代谢，而由尿液及粪便排出。

【贮藏】遮光，密闭，在阴凉处（不超过 20℃）保存。

【包装】100ml 玻璃输液瓶，1 瓶/盒。

【有效期】24 个月。

【执行标准】WS1-（X-006）-2006Z

【批准文号】国药准字 H20030380



企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2166666

传真号码：0533-2184991

网址：www.xhzy.com

苦参素氯化钠注射液标签文字：

派蒙®

苦参素氯化钠注射液

Matrine and Sodium Chloride Injection

100ml：苦参素（按氧化苦参碱计）0.6g 与氯化钠 0.9g

国药准字 H20030380

【适应症】用于慢性乙型病毒性肝炎的治疗。

【用法用量】

静脉滴注。每日一次，每次 0.6g（1 瓶），两个月为一疗程，或遵医嘱。

【贮藏】遮光，密闭，在阴凉处（不超过 20℃）保存。

生产日期：

产品批号：

有效期至



山东新华制药股份有限公司

苦参素氯化钠注射液纸盒文字：

派蒙®

苦参素氯化钠注射液

Matrine and Sodium Chloride Injection

100ml：苦参素（按氧化苦参碱计）0.6g 与氯化钠 0.9g

国药准字 H20030380

本品主要成份为苦参素，氯化钠。

【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。

【适应症】用于慢性乙型病毒性肝炎的治疗。

【用法用量】

静脉滴注。每日一次，每次 0.6g（1 瓶），两个月为一疗程，或遵医嘱。

【不良反应】患者对本品有较好的耐受性，不良反应发生率较低。（详见说明书）

【禁忌】对本品过敏者禁用。

【注意事项】

肝功能衰竭者慎用。（详见说明书）

【贮藏】遮光，密闭，在阴凉处（不超过 20℃）保存。

生产日期：

产品批号：

有效期至



山东新华制药股份有限公司