复方对乙酰氨基酚片说明书

OTC

乙类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：复方对乙酰氨基酚片

英文名称：Compound Paracetamol Tablets

汉语拼音：Fufang Duiyixian’anjifen Pian

[成份] 本品为复方制剂，每片含主要成份为对乙酰氨基酚 126 毫克，阿司匹林 230 毫克，咖啡因 30 毫克。辅料为：淀粉、糊精、可压性淀粉。

[性状] 本品为白色片，味微酸苦，遇湿气易变质。

[作用类别] 本品为解热镇痛类非处方药药品。

[适应症] 用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

[规格] 对乙酰氨基酚 126 毫克，阿司匹林 230 毫克，咖啡因 30 毫克。

[用法用量] 口服，成人一次 1 片，若持续发热或疼痛，可间隔 4-6 小时重复用药一次，24 小时内不超过 4 次。

[不良反应]

1.较常见的有恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等胃肠道反应。

2.较少见或罕见的有①胃肠道出血或溃疡，多见于大剂量服用本品的患者；②过敏性支气管哮喘；③皮疹、荨麻疹、皮肤瘙痒等；④血尿、眩晕和肝脏损害。

[禁忌]

1.孕妇、哺乳期妇女禁用。

2.喘息、鼻息肉综合征、对阿司匹林及其他解热镇痛药过敏者禁用。

3.血友病或血小板减少症患者禁用。

4.活动性出血性疾病患者禁用。

5.严重肝肾功能不全者禁用。

[注意事项]

1.本品为对症治疗药，用于解热连续使用不超过 3 天，用于止痛不超过 5 天，症状未缓解请咨询医师或药师。

2.痛风、心功能不全、鼻出血、月经过多以及有溶血性贫血史者慎用。

3.肝、肾功能不全者慎用。

4.不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。

5.服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。

6.如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。

7.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

8.本品性状发生改变时禁止使用。

9.请将本品放在儿童不能接触的地方。

10.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1.不宜与抗凝药（如双香豆素、肝素）同用。

2.本品与皮质激素类同用，可增加胃肠道不良反应。

3.本品不宜与氯霉素、巴比妥类、颠茄类药物同服。

4.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 本品中阿司匹林及对乙酰氨基酚均能抑制前列腺素合成，具有解热镇痛作用；咖啡因为中枢兴奋药，能增强上列药物的解热镇痛作用。

[贮藏]密封，在干燥处保存。

[包装]铝塑包装或塑料瓶包装，15 片/板或 50 片/瓶，100 片/瓶,1000 片/瓶。

[有效期]18 个月。

[执行标准]部颁标准化学药品及制剂第一册 WS_1-67-(B)-89

[批准文号]国药准字 H37022339

[说明书修订日期]核准日期：2007.04.06

[生产企业]

企业名称：山东新华制药股份有限公司
生产地址：山东省淄博市张店区东一路 14 号
邮政编码：255005
电话号码：0533-2166666
传真号码：0533-2184991
网址：www.xhzy.com

如有问题可与生产企业联系

复方对乙酰氨基酚片纸盒文字：

复方对乙酰氨基酚片

Compound Paracetamol Tablets

OTC

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

乙类

国药准字 H37022339

[性状]本品为白色片，味微酸苦，遇湿气易变质。

[适应症]用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

[用法用量]口服，成人一次 1 片，若持续发热或疼痛，可间隔 4-6 小时重复用药一次，24 小时内不超过 4 次。

[不良反应]较常见的有恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等胃肠道反应。（详见说明书）

[禁忌]孕妇、哺乳期妇女禁用。（详见说明书）

[注意事项]肝、肾功能不全者慎用。（详见说明书）

[贮藏]密封，在干燥处保存。

生产日期：

产品批号：

有效期至

山东新华制药股份有限公司

复方对乙酰氨基酚片标签文字：

复方对乙酰氨基酚片

Compound Paracetamol Tablets

OTC

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

乙类

国药准字 H37022339

[性状]本品为白色片，味微酸苦，遇湿气易变质。

[适应症]用于普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

[用法用量]口服，成人一次 1 片，若持续发热或疼痛，可间隔 4-6 小时重复用药一次，24 小时内不超过 4 次。

[贮藏]密封，在干燥处保存。

生产日期：

产品批号：

有效期至

山东新华制药股份有限公司