

己烯雌酚片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】通用名：己烯雌酚片


英文名：Diethylstilbestrol Tablets

汉语拼音：Jixicifen Pian

【成份】主要成份：己烯雌酚

化学名称：（E）-4，4' -（1，2-二乙基-1，2-亚乙烯基）双苯酚。

化学结构式：



分子式为：C₁₈H₂₀O₂ 分子量：268.36

【性状】本品为白色片。

【适应症】

1. 补充体内雌激素不足，如萎缩性阴道炎、女性性腺发育不良、绝经期综合征、老年性外阴干枯症及阴道炎、卵巢切除后、原发性卵巢缺如。
2. 乳腺癌、绝经后及男性晚期乳腺癌、不能进行手术治理者。
3. 前列腺癌，不能手术治理的晚期患者。
4. 预防产后泌乳、退（或回）乳。

【规格】0.5mg

【用法用量】1. 口服①用于补充体内不足，一日0.25-0.5mg（1/2-1片），21天后停药一周，周期性服用，一般可用3个周期（自月经第5天开始服药）；②用于乳腺癌，一日15mg（30片），6周内无改善则停药；③用于前列腺癌，开始时一日1-3mg（2-6片），依据病情递增而后递减；维持量一日1mg（2片），连用2-3个月；④预防产后泌乳、退乳，一次5mg（10片），一日3次，连服3天。

【不良反应】1. 可有不规则的阴道流血、子宫肥大、尿频或小便疼痛。

2. 有时可引发血栓症以及心功能不正常。

3. 有时引起肝功能异常、高脂血症、钠潴留。

4. 引起消化道恶心、呕吐、厌食症状和头痛、头晕等精神症状。

【禁忌】1. 孕妇禁用（可能引起第二代女性阴道腺病及腺癌发生率升高，男性生殖道异常及精子异常发生率增加）。

2. 有血栓性静脉炎和肺栓塞性病史患者禁用。

3. 与雌激素有关的肿瘤患者及未确证的阴道不规则流血患者、高血压患者禁用。

【注意事项】1. 下列患者慎用：心功能不全、癫痫、糖尿病、肝肾功能障碍、精神抑郁等。

2. 长期使用应定期检查血压、肝功能、阴道脱落细胞，每年一次宫颈防癌刮片。

3. 诊断干扰：①减低美替拉酮试验。

②增加去甲肾上腺素导致的血小板凝集试验。

③BSP 试验滞留增加。

【孕妇及哺乳期妇女用药】禁用。

【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】易引起钠潴留和高血钾症，应慎用。

【药物相互作用】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】本品为人工合成的非甾体雌激素。主要作用有：①促使女性器官及副性征正常发育。②促使子宫内膜增生和阴道上皮角化。③增强子宫收缩，提高子宫对催产素的敏感性。④小剂量刺激而大剂量抑制垂体前叶促性腺激素及催乳激素的分泌。⑤抗雄激素作用。

【药代动力学】本品口服效果好，不易被肝破坏，其代谢途径尚不明确。

【贮藏】遮光，密封保存。

【包装】塑料瓶包装：100 片/瓶、1000 片/瓶。

【有效期】24 个月

【执行标准】中国药典 2015 年版二部

【批准文号】国药准字 H37020313

【生产企业】



企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市张店区东一路 14 号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2166666

传真：0533-2184991

网址：www.xhzy.com