

OTC

烟酸片说明书

甲类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：烟酸片

英文名称：Nicotinic Acid Tablets

汉语拼音：Yansuan Pian

[成份] 本品每片含烟酸 50 毫克，辅料为淀粉、糊精、硬脂酸镁。

[性状] 本品为白色片。

[作用类别] 本品为维生素类非处方药药品。

[适应症] 用于预防和治疗烟酸缺乏症，如糙皮病等。

[规格] 50 毫克

[用法用量] 口服，成人，一次 1-2 片，一日 5 次，一日用量不超过 10 片。儿童，一次 0.5—1 片，一日 2~3 次。

[不良反应]

1. 本品在肾功能正常时几乎不会发生毒性反应。本品的一般不良反应有：感觉温热、皮肤发红、特别在脸面和颈部、头痛等血管扩张反应。
2. 大剂量用药可导致腹泻、头晕、乏力、皮肤干燥、瘙痒、眼干燥、恶心、呕吐、胃痛、高血糖、高尿酸、心律失常、肝毒性反应。
3. 一般服烟酸 2 周后，血管扩张及胃肠道不适可渐适应，逐渐增加用量可避免上述反应。如有严重皮肤潮红、瘙痒、胃肠道不适，应减少剂量。

[禁忌] 尚不明确。

[注意事项]

1. 症状消失后应停药。
2. 孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用。
3. 糖尿病、青光眼、痛风、高尿酸血症、肝病、溃疡病、低血压等患者慎用。
4. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 异烟肼可阻止烟酸与辅酶 I 结合而致烟酸缺少，故服异烟肼时宜适量补充烟酸或烟酰胺。
2. 烟酸与血管扩张剂（如胍乙啶等降血压药）不宜合用。
3. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 本品在体内转变为烟酰胺，后者是辅酶 I 和辅酶 II 的组成部分，参与体内生物氧化过程，缺乏时产生糙皮病，其症状包括皮炎、舌炎、食欲缺乏、烦躁失眠、感觉异常等。

[贮藏] 密封保存。

[包装] 铝塑包装或塑料瓶包装，15 片/板或 100 片/瓶。

[有效期] 24 个月。

[执行标准] 中国药典 2015 年版二部

[批准文号] 国药准字 H37020382

[说明书修订日期] 核准日期：

修改日期：

修改日期：

[生产企业]

企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市张店区东一路 14 号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2166666

传真号码：0533-2184991

网址：www.xhzy.com

如有问题可与生产企业联系