

A:B

A:B

A:B


A:B

A:B

JHYGF



国药准字H37020717



维生素C注射液

Vitamin C Injection

5ml : 0.5g · 5支

山东新华制药股份有限公司

SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

生产日期：
产品批号：
有效期至：

维生素C注射液

码上放心·追溯码

请用手机淘宝扫码查询

电话查询：010-95001111

3010304812E

核准日期：2007.03.28
修改日期：2008.06.30
修改日期：2010.10.01
修改日期：2015.12.01
修改日期：2020.12.01

维生素C注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：维生素C注射液

英文名称：Vitamin C Injection


汉语拼音：Weishengsu C Zhusheyey

【成份】

主要成份：维生素C

化学名称：L-抗坏血酸

化学结构式：

分子式：C₆H₈O₆；分子量：176.13

辅料：碳酸氢钠，偏重亚硫酸钠，盐酸半胱氨酸

【性状】

本品为无色至微黄色的澄明液体。

【适应症】

- 用于治疗坏血病，也可用于各种急慢性传染性疾病及紫癜等辅助治疗。
- 慢性铁中毒的治疗，维生素C促进去铁胺对铁的螯合，使铁排出加速。
- 特发性高铁血红蛋白症的治疗。
- 下列情况对维生素C的需要量增加：(1)病人接受慢性血液透析、胃肠道疾病(长期腹泻、胃或回肠切除术后)、结核病、癌症、溃疡病、甲状腺机能亢进、发热、感染、创伤、烧伤、手术等；(2)因严格控制或选择饮食、接受极端营养的病人、因营养不良、体重骤降，以及在妊娠期和哺乳期；(3)应用巴比妥类、四环素类、水杨酸类，或以维生素C作为泌尿系统酸化药时。

【规格】5ml：0.5g

【用法用量】

- 肌肉或静脉注射，成人每次100-250mg (1/5-1/2支)，每日1-3次；儿童每次100-300mg (1/5-3/5支)，分次注射。必要时，成人每次2-4g (4-8支)，每日1-2次，或遵医嘱。

【不良反应】

- 长期应用每日2-3g可引起停药后坏血病。
- 长期应用大量维生素C偶可引起尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石。
- 快速静脉注射可引起头晕、头痛。

【禁忌】

尚不明确。

【注意事项】

- 维生素C对下列情况的作用未被证实：预防或治疗癌症、牙龈炎、化脓、出血、血尿、视网膜出血、抑郁症、酗酒、贫血、痤疮、不育症、衰老、动脉硬化、溃疡病、结核、痢疾、胶原性疾病、骨折、皮肤溃疡、枯草热、药物中毒、血管检查、感冒等。
- 对诊断的干扰：大量服用将影响以下诊断性试验的结果：(1)大便隐血可致假阳性；(2)能干扰血清乳酸脱氢酶和血清转氨酶浓度的自动分析结果；(3)尿糖(硫酸铜法)、葡萄糖(氧化酶法)均可致假阳性；(4)尿中草酸盐、尿酸盐和半胱氨酸等浓度增高；(5)血清胆红素浓度下降；(6)尿pH下降。
- 下列情况应慎用：(1)半胱氨酸尿症；(2)痛风；(3)高草酸盐

尿症；(4)草酸盐沉积症；(5)尿酸盐性肾结石；(6)糖尿病(因维生素C可能干扰血糖定量)；(7)葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症；(8)血色病；(9)铁粒幼细胞性贫血或地中海贫血；(10)镰形红细胞贫血。

4、长期大量服用突然停药，有可能出现坏血病症状，故宜逐渐减量停药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

本品可通过胎盘，可分泌入乳汁。孕妇大量服用时，可产生婴儿坏血病。

【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】

- 大量维生素C可干扰抗凝药的抗凝效果。
- 与巴比妥或扑米酮等合用，可促使维生素C的排泄增加。
- 纤维索磷酸钠可促使维生素C代谢为草酸盐。
- 长期或大量应用维生素C时，能干扰双硫仑对乙醇的作用。
- 水杨酸类能增加维生素C的排泄。
- 不宜与碱性药物(如重碳酸、碳酸氢钠、谷氨酸钠等)、核黄素、三氟叔丁醇、铜、铁离子(微量)的溶液配伍，以免影响疗效。
- 与维生素K₃配伍，因后者有氧化性，可产生氧化还原反应，使两者疗效减弱或消失。

【药物过量】每日1-4g，可引起腹泻、皮疹、胃酸增多、胃液反流。有时尚可见泌尿系统、尿内草酸盐与尿酸盐排出增多、深静脉血栓形成、血管内溶血或凝血等，有时可导致白细胞吞噬能力降低。每日用量超过5g时，可导致溶血，重者可致命。孕妇应用大量时，可产生婴儿坏血病。

【药理毒理】本品为维生素类药。维生素C参与氨基酸代谢、神经递质的合成、胶原蛋白和组织细胞间质的合成，可降低毛细血管的通透性，加速血液的凝固，刺激凝血功能，促进铁在肠内吸收，促使血脂下降，增加对感染的抵抗力。参与解毒功能，且有抗组胺的作用及阻止致癌物质(亚硝酸盐)生成的作用。

【药代动力学】蛋白结合率低。少量贮藏于血浆和细胞，以脾脏组织内的浓度为最高。肝内代谢。极少数以原形物或代谢物经肾排泄，当血浆浓度>14μg/ml时，尿内排出量增多。可经血液透析清除。

【贮藏】遮光，密闭保存。

【包装】5ml安瓿，5支/盒。

【有效期】10个月。

【执行标准】中国药典2020年版二部

【批准文号】国药准字H37020717

【生产企业】

企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号

邮政编码：255086

电话号码：0533-2196361

传真号码：0533-2196365

网 址：www.xhzy.com

【药品上市许可持有人】

企业名称：山东新华制药股份有限公司

注册地址：淄博市高新技术产业开发区化工区

邮政编码：255000

电话号码：0533-2166666

传真号码：0533-2164991

网 址：www.xhzy.com

*绿帽团：*家*家*家*

华恒宇药业

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

【批单号】：【批单号】：【批单号】：【批单号】

维生素C注射液

客户名称	山东新华制药				颜色	同批生产
产品名称	E版-维生素C注射液5ml 0.5g 5支小盒					
成品尺寸	106x94x19mm					
请对此稿内容进行确认：颜色、文字、版式、条码、尺寸、材质					制作	靳利焕
材质		产 品	改版-E		日期	2020.10.6
客户签字	马建华 2020.10.17			制版编号	XHZY-003	
济南金恒宇包装股份有限公司						