

水杨酸钠片说明书

【药品名称】通用名：水杨酸钠片

英文名：Sodium Salicylate Tablets

汉语拼音：Shuiyangsuanna Pian

【成份】主要成份：水杨酸钠

【化学名称】：邻羟基苯甲酸钠。

【性状】本品为白色或微淡红色片，遇光易变质。

【规格】0.3g；0.5g

【适应症】曾用于风湿热及类风湿关节炎的治疗，现已少用。

【用法用量】口服 一次0.5-1.0g（1-3片），一日3次。

【不良反应】本品的主要不良反应是胃肠道反应和水杨酸反应，表现为恶心、呕吐、头痛、眩晕、耳鸣及听力、视力减退。

【禁忌】对水杨酸类药过敏者禁用。

【注意事项】（1）肝肾功能不全患者慎用。

（2）消化性溃疡患者慎用。

（3）同服碳酸氢钠可使本品血药浓度下降而减低疗效。

（4）注意高钠对疾病的影响。

（5）曾用于风湿热及类风湿关节炎的治疗 $\frac{2}{3}$ ，现已少用 $\frac{1}{3}$ 。

【孕妇及哺乳期妇女用药】水杨酸钠易透过胎盘，可诱发畸胎，故孕妇禁用。

【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】（1）本品与其他水杨酸类药物合用时，可增强它们的毒性。

（2）本品与双香豆素合用时，因从血浆蛋白结合部位置换后者，提高游离型双香豆素血浓度，增强其抗凝作用，易致出血。

（3）本品也可置换磺脲类降血糖药甲磺丁脲，增强其降血糖作用，易致低血糖反应。

（4）与肾上腺皮质激素合用，也因蛋白置换而使激素抗炎作用增强，但诱发溃疡的作用也增强。

（5）本品减少甲氨蝶呤从肾小管分泌而增强其毒性。

（6）与呋塞米合用，因竞争肾小管分泌系统而使水杨酸排泄减少，造成蓄积中毒。

【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】本品的活性成分为水杨酸，其作用机制与阿司匹林相似，通过抑制环氧合酶，减少前列腺素的合

成，起到抗炎、抗风湿和解热镇痛作用。其抗炎抗风湿作用与阿司匹林相似，但解热、镇痛作用较弱。本品无抗血小板聚集作用。

急性毒性试验结果：大鼠腹腔注射 LD₅₀ 为 780mg/Kg。

【药代动力学】 本品为阿司匹林的代谢产物，口服后吸收迅速、完全，可分布于全身各组织，也能渗入关节腔和脑脊液。在肝脏代谢，代谢产物主要为水杨尿酸和葡糖醛酸结合物，小部分为龙胆酸。本品为阿司匹林的代谢产物，根据阿司匹林的药代动力学研究发现，水杨酸的血浆蛋白结合率为 65%~90%，主要从肾脏排泄，小剂量服用时 T_{1/2} 为 2~3 小时，大剂量时则可达 20 小时以上。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【包装】 塑料瓶包装：100 片/瓶、1000 片/瓶。

【有效期】 24 个月

【执行标准】 卫生部药品标准(化学药品及制剂第一册)

【批准文号】 国药准字 H37020305；国药准字 H37020306

【生产企业】



企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市张店区东一路 14 号

邮政编码：255005

电话号码：0533-2166666

传真：0533-2184991

网址：www.xhzy.com