

核准日期: 2007.03.28
修订日期: 2011.12.29
修订日期: 2013.11.17
修订日期: 2015.12.01
修订日期: 2020.10.09
修订日期: 2020.12.01

乙酰胺注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称: 乙酰胺注射液

英文名称: Acetamide Injection

汉语拼音: Yixian' an Zhushuye

【成份】

主要成份: 乙酰胺

化学结构式: $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{NH}_2$

分子式: $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}$; 分子量: 59.06

辅料: 氯化钠。

【性状】本品为无色的澄明液体。

【适应症】用于氟乙酰胺、氟醋酸钠及甘氟中毒特效解毒。

【规格】(1) 2ml:1g; (2) 5ml:2.5g; (3) 10ml:5g。

【用法用量】肌肉注射。

2ml:1g 一次 2.5 ~ 5g ($2\frac{1}{2}$ ~ 5 支), 一日 2 ~ 4 次, 或按每日 0.1 ~ 0.3g/kg, 分 2 ~ 4 次注射, 一般连续注射 5 ~ 7 日; 危重病人可给予 5 ~ 10g (5 ~ 10 支)。

5ml:2.5g 一次 2.5 ~ 5g (1 ~ 2 支), 一日 2 ~ 4 次, 或按每日 0.1 ~ 0.3g/kg, 分 2 ~ 4 次注射, 一般连续注射 5 ~ 7 日; 危重病人可给予 5 ~ 10g (2 ~ 4 支)。

10ml:5g 一次 2.5 ~ 5g ($1\frac{1}{2}$ ~ 1 支), 一日 2 ~ 4 次, 或按每日 0.1 ~ 0.3g/kg, 分 2 ~ 4 次注射, 一般连续注射 5 ~ 7 日; 危重病人可给予 5 ~ 10g (1 ~ 2 支)。

【不良反应】

1. 注射时可引起局部疼痛, 本品一次量 (2.5g ~ 5g), 注射时可加入盐酸普鲁卡因 20 ~ 40mg 混合使用, 以减轻疼痛。

2. 大量应用可能引起血尿, 必要时停药并加用糖皮质激素使血尿减轻。

【注意事项】

1. 氟乙酰胺中毒病人, 包括可疑中毒者均应及时给予本品, 尤其早期应给予足量。

2. 与解痉药、半胱氨酸合用，效果较好。

【孕妇及哺乳期妇女用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】

为氟乙酰胺杀虫农药解毒剂。其解毒机理可能由于其化学结构和氟乙酰胺相似，故能争夺某些酶（如酰胺酶）使不产生氟乙酸，从而消除氟乙酸对肌体三羧循环的毒性作用，具有延长中毒潜伏期制止发病，减轻发病症状作用。

【药代动力学】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【贮藏】遮光，密闭保存。

【包装】(1) 2ml:1g 2ml 安瓿，5支/盒，10支/盒；
(2) 5ml:2.5g 5ml 安瓿，5支/盒，10支/盒；
(3) 10ml:5g 10ml 安瓿，5支/盒，10支/盒。

【有效期】24个月。

【执行标准】中国药典 2020 年版二部。

【批准文号】(1) 2ml:1g 国药准字 H37023214；
(2) 5ml:2.5g 国药准字 H37023213；
(3) 10ml:5g 国药准字 H37023215。

【生产企业】



企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号

邮政编码：255086

电话号码：0533-2196361

传真号码：0533-2196365

网 址：www.xhzy.com

【药品上市许可持有人】

企业名称：山东新华制药股份有限公司

注册地址：淄博市高新技术产业开发区化工区

邮政编码：255000

电话号码：0533-2166666

传真号码：0533-2184991

网 址：www.xhzy.com

301030511F