

正面


修订日期：2024 年 01 月 30 日
修改日期：2024 年 04 月 01 日
修改日期：2024 年 07 月 09 日

帕拉米韦注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。

**警告：本品治疗时，应谨慎考虑本品的必要性。
本品预防给药的有效性和安全性尚未确定**

【药品名称】
通用名称：帕拉米韦注射液
英文名称：Peramivir Injection
汉语拼音：Palamiwei Zhusheyey
【成份】
本品活性成份为帕拉米韦
化学名称：（1S, 2S, 3R, 4R）-3- [（S）-1-乙氧羰基-2-乙基丁基]-4-胍基-2-羟基环戊烷-1-羧酸三水合物
化学结构式：



分子式：C₂₃H₃₈N₆O₇·3H₂O
分子量：382.45
辅料：氯化钠（供注射用）、盐酸、氢氧化钠、注射用水。

【性状】
本品为无色的澄明液体。
【适应症】
用于治疗甲型或乙型流行性感冒。
【规格】
15ml:0.15g（按C₂₃H₃₈N₆O₇计）
【用法用量】

成人：常用剂量为每次帕拉米韦300mg，经15分钟以上单次静脉滴注。
对于因合并症等病情可能加重的患者，剂量为每日一次600mg并经15分钟以上单次静脉滴注，根据症状可连续多日重复给药。此外，根据年龄及症状酌情减量。
儿童：常用剂量为每日一次帕拉米韦10mg/kg，经15分钟以上单次静脉滴注，根据症状可连续多日重复给药。每次剂量不得超过600mg。
配制说明：
本品静脉内给药可以无需进一步稀释，也可以用 0.9%氯化钠注射液、5%葡萄糖注射液或乳酸钠林格注射液稀释所需剂量的帕拉米韦注射液，最多稀释至100mL。
当与0.9%氯化钠注射液、5%葡萄糖注射液或乳酸钠林格注射液混合后，可在±3℃条件下保存24小时。如果冷藏，允许稀释后的帕拉米韦注射液达到室温，然后立即给药。
用法用量方面的使用注意事项：
1. 出现症状后，最好尽快使用本品开始治疗。对于出现症状超过48小时后才开始治疗的患者，尚未获得证明本品有效性的数据。
2. 根据体温等临床症状判断需要继续用药的情况下才可以重复给药，不可盲目地持续治疗。此外，3日以上重复给药的应用经验有限。
3. 肾功能损害患者：应根据肾功能降低的程度，按下表所示相应地调整剂量。本品重复给药时，也应按下表调整剂量。

表 1. 肾功能损害患者剂量调整

Ccr (mL/分)	一次剂量	病情可能加重的患者
50 ≤ Ccr < 50	300 mg	600 mg
30 ≤ Ccr < 30	100 mg	200 mg
10* ≤ Ccr < 30	50 mg	100 mg


Ccr：肌酐清除率
※：对于肌酐清除率低于 10mL/分 的患者以及透析患者，应谨慎地调整剂量。帕拉米韦可经血液透析迅速从血浆中清除。

【不良反应】
根据国外文献报道的不良反 应：严重不良反应
1. 休克、过敏反应（发生频率未知）
症状可见血压过低、面色苍白、出冷汗、呼吸困难、荨麻疹等。
2. 白细胞减少、中性粒细胞减少（1%<3%）
3. 急性肝炎、肝功能损害、黄疸（发生频率未知）
在治疗早期（给药次日）可见伴有 AST、ALT、γ-GTP、Al-P 显著升高的肝功能损害、黄疸。
4. 急性肾损害（发生频率未知）
5. 精神神经症状（意识障碍、谵妄、幻觉、妄想、痉挛等）、异常行为（发生频率未知）。尽管因果关系不明，但是感染流感时，可能会出现导致跌倒等的异常行为（急速走路，步履蹒跚等）。
6. 肺炎（发生频率未知）
7. 中毒性表皮坏死松懈症（TEN）、史蒂文斯-约翰森综合征（Stevens-Johnson综合征）（发生频率未知）
8. 血小板减少（发生频率未知）
9. 出血性结肠炎（发生频率未知）
10. 其他不良反应

表 2. 不良反应发生情况

种类 / 发生频率	≥ 1%	0.5%~1%	< 0.5%	发生频率未知
皮肤	皮疹	皮疹	湿疹、荨麻疹	
消化系统	腹泻 (6.3%)、恶心、呕吐	腹痛	食欲不振、腹部不适、口腔炎	
肝脏	AST 升高、ALT 升高	LDH 升高、胆红素升高、γ-GTP 升高	Al-P 升高	
肾脏	蛋白尿、尿 β ₂ -微球蛋白升高、血肌酐升高	BUN 升高		
血液	淋巴细胞增加	嗜酸性粒细胞增多	血小板减少	
精神神经系统			眩晕、失眠	
其他	血糖升高	尿潜血阳性、CK 升高、尿酸	雾视	血管疼痛

【禁 忌】
对本品成分有过敏史的患者不得用药。



【注意事项】
1. 本品治疗时，应谨慎考虑本品的必要性。
●鉴于并非所有甲型或乙型流感病毒感染患者都必须使用抗病毒药物，在本品治疗时应仔细观察患者的状态，并谨慎考虑本品治疗的必要性。
●鉴于本品为静脉滴注制剂，应充分考虑口服制剂和吸入剂等其他抗流感病毒药物是否可用，并研究本品治疗的必要性。
●注意流感病毒的耐药性信息，研究使用本品治疗是否适当。
●本品对丙型流感病毒感染没有疗效。
●本品对细菌感染没有疗效。
2. 不论是是否使用或使用何种类的抗流感病毒药，在感染流感时均报告有出现异常行为的症状作为因异常行为引起跌倒等意外事故的预防措施，应向患者及家属说明：
●有出现异常行为的 风险，
●在自家养病时，至少应在发烧后两天期间向护理人员等讲解防止跌倒等事故的措施。
此外，可导致跌倒等意外事故的严重异常行为大多报告于入学后的儿童、未成年男性等，并且多发生在发烧后的两天期间。
3. 细菌感染症合并流感病毒感染时，可能会与流感样症状相混淆。对于细菌感染症以及疑似为细菌感染症时，需要给予抗菌药等进行适当处置。
4. 因在治疗早期（如给药次日）即可出现肝功能损害、黄疸，因此在给药后应立即密切监测患者的状态，如进行肝功能检查。
5. 因可能出现休克及过敏性反应，在给药期间应在能够进行紧急治疗的状态下密切监测患者的状态。此外，即使在给药结束后也可出现休克、过敏性反应，因此应予以注意。
6. 辅料成分（氯化钠、注射用水）可引起钠负荷及循环血容量增加，可能会造成心脏负担，对于心脏、循环系统功能障碍的患者症状可能会加重。
7. 对于肾功能损害患者，应根据肌酐清除率相应地调整剂量，监测患者的状况并谨慎用药。本品为经肾排泄的药物，因此血药浓度可能会持续较高。此外，辅料成分（氯化钠、注射用水）容易造成水分、氯化钠过量，进而症状可能会加重。

【孕妇及哺乳期妇女用药】
对孕妇或可能怀孕的女性用药时，仅可在经判断后认为治疗效益大于风险时才能用药。大鼠实验中报告本品可透过大鼠胎盘，家兔实验中报告有流产和早产。
对哺乳期间母亲，应权衡治疗及母乳喂养的必要性，考虑继续或中止哺乳。据报告，本品可向大鼠乳汁中分泌。
【儿童用药】
尚未开展低体重出生儿、新生儿、肾功能损害儿童等人群的临床试验。

【老年用药】
在给药时应监测患者的状况。通常来说，大多数老年人的生理功能下降。
【药物相互作用】
帕拉米韦对主要的人类肝细胞色素P450（CYP）酶CYP1A2、2A6、2C9、2C19、2D6、2E1 及3A4 未显示抑制作用。对CYP1A2、2A6、2C9、2D6 及 3A4 未显示出诱导作用。此外，帕拉米韦不是P-糖蛋白的底物，对P-糖蛋白介导的药物转运也未显示出抑制作用（体外试验）。

【药物过量】
据报告，本品经血液透析可迅速从血浆中清除。
【临床药理】
血药浓度
对健康成人男性受试者每组6例单次静脉滴注100mg、200mg、400mg、800mg^[1]，血药药物浓度变化如图1所示，单次/重复静脉滴注时的药代动力学参数如表3和表4所示。Cmax及AUC均呈剂量比例关系增加，帕拉米韦迅速被清除，平均滞留时间（MRT）约3小时。相比单次给药，重复给药时的药代动力学几乎 没有变化，未见蓄积性。




图1 单次给药时的血浆药物浓度（健康成人）

表 3. 单次给药药代动力学参数

剂量 (mg)	例数	单次给药				
		Cmax (ng/mL)	AUC _{0-∞} (ng·hr/mL)	CL ^[1] (L/hr)	MRT (hr)	Vss ^[2] (L)
100	6	11200±2900	17513±2001	5.77±0.61	2.64±0.33	15.16±2.14
200	6	21100±1600	33695±3622	5.99±0.65	2.65±0.27	15.77±1.35
400	6	46800±7000	63403±8620	6.41±0.90	2.44±0.28	15.53±1.71
800	6	86200±15400	133795±19972	6.10±0.96	2.83±0.49	16.96±1.53

表 4. 重复给药药代动力学参数

剂量 (mg)	例数	重复给药（第 6 日）		
		Cmax (ng/mL)	AUC _{0-∞} ^[2] (ng·hr/mL)	CL ^[1] (L/hr)
100	6	10900±2000	16436±1540	6.13±0.56
200	6	19800±2300	30358±2980	6.64±0.69
400	6	45300±8000	65409±9498	6.23±0.93
800	6	85500±13100	131385±12871	6.14±0.58

※1：全身清除率
※2：稳态分布容积
※3：稳态给药期间（24 小时）的 AUC

（测定法：LC/MS/MS）（平均值 ± 标准差）

分布
人体组织分布
对健康成人男性受试者每组6例单次静脉滴注100mg、200mg、400mg、800mg^[1]，上呼吸道分泌物（咽喉分泌物及鼻腔分泌物）中的药物浓度随剂量相应增加；研究发现，相比于血浆，有3~9%（基于AUC）分布到上呼吸道分泌物中。此外，400mg 剂量给药时，咽喉分泌物及鼻腔分

反面

泌液中的峰浓度分别为930及 1210ng/mL。
大鼠组织分布
对大鼠单次静脉给药 [¹⁴C]-帕拉米韦24mg/kg，所有组织中的放射性浓度均在给药后5分钟达到峰浓度。此外，研究发现本品在作用部位肺及气管中分布良好，主排泄器官肾脏中观察到有较高的分布。所有组织中的放射性浓度在给药后48小时内降低至定量限之下，这表明组织蓄积性及残留性很低。此外，本品的脑内分布极低。
蛋白结合率
在1~100 μg/mL 的浓度范围内，人血清蛋白结合率（超滤法）为0.3~1.8%（体外试验）。
代谢
对健康成人男性受试者6例单次静脉滴注400mg，血浆及尿中未检出代谢物，仅检测到原型药物。
排泄
对健康成人男性受试者每组6例单次静脉滴注100mg、200mg、400mg、800mg^[1]，给药后48小时内的尿排泄率（平均值）为86.3~95.4%，6日重复给药时相对总剂量的尿中排泄率（平均值）为77.2~92.6%。
特殊人群
肾功能损害者
使用从日本人健康成人及流感患者以及国外健康成人、肾功能损害者及健康老年人的临床试验中获得的332例受试者及3199个血浆药物浓度数据点，进行了群体药代动力学分析。在帕拉米韦药代动力学（CL）的影响因子中，肾功能损害（Ccr）对药代动力学的影响较大，必须根据Ccr相应地调整剂量。
对健康成人男性受试者，剂量调整时（相当于300mg）的血浆药物浓度曲线如图2。此外，各肾功能损害者组中剂量调整时的Cmax及AUC如表5所示。




图 2 肾功能损害者组中剂量调整时（相当于 300mg）的血浆药物浓度曲线

表 5. 肾功能损害者组中剂量调整时的 Cmax 及 AUC^[2]

Ccr (mL/分)	相当于 300mg				相当于 600mg			
	剂量 (mg)	Cmax (ng/mL)	AUC (g·hr/mL)		剂量 (mg)	Cmax (ng/mL)	AUC (g·hr/mL)	
10 ≤ Ccr < 30	50	4742 (3192-7467)	37162 (21433-87284)		100	9415 (6414-14591)	42922 (173312)	
30 ≤ Ccr < 50	100	9245 (6291-14323)	33669 (22976-50453)		200	18471 (12564-28283)	45769 (102417)	
50 ≤ Ccr < 80	300	27044 (18652-40920)	60233 (41298-87803)		600	54047 (37078-81364)	83155 (175174)	
80 ≤ Ccr < 140	300	26005 (18133-38645)	36423 (26114-52916)		600	51814 (36020-76820)	51520 (104974)	

※：中位值（90% 预测范围）。使用基于群体药代动力学分析软件 NONMEM[®] 的药代动力学参数的曲线结果
●对22例受试者（包括肾功能损害者）单次静脉滴注 2mg/kg^[2]，血浆药物浓度如图3所示，药代动力学参数如表6所示。随着肾功能下降，帕拉米韦从血浆中清除延迟，AUC增大（国外人的数据）。




图 3 单次给药时的血浆药物浓度（肾功能损害者）

表 6. 包括肾功能损害患者的药代动力学参数

Ccr (mL/分)	例数	Cmax (ng/mL)	AUC _{0-∞} (ng·hr/mL)	CL (mL/分)
Ccr<30	5	13200±2910	137000±41100	21.1±4.68
30 ≤ Ccr<50	6	13700±3780	108000±31200	26.8±5.35
50 ≤ Ccr ≤ 80	5	12500±3590	33900±7880	77.9±21.4
Ccr>80	6	12800±2860	26000±3180	108 ±9.90

（测定法：LC/MS/MS）（平均值 ± 标准差）

●对血液透析患者6例单次静脉滴注2mg/kg^[12]，血浆药物浓度如图4所示。从滴注2小时后再开始进行4小时血液透析，血浆药物浓度约降低1/4（国外人的数据）。




图 4 单次给药时的血浆药物浓度（血液透析患者）

儿科患者
对儿科患者115例（4个月~15岁）单次静脉滴注10mg/kg（体重60kg以上的剂量为600mg），滴注结束后4小时内的血浆药物浓度（185个数据点）如图5所示。此外，使用能测出血浆药物浓度的所有297个数据点进行了群体药代动力学分析，所得的药代动力学参数如表7所示。




图5 单次给药时的血浆药物浓度（儿科患者）

表 7. 儿科患者药代动力学参数^[8]

	例数	Cmax (ng/mL)	AUC _{0-∞} (ng·hr/mL)
总体	115	38768 (23880-58835)	56569 (37531-82620)
0~<1岁	4	25848 (23880-28319)	47941 (43040-53535)
1~<2岁	8	27587 (24793-37604)	44472 (41398-52018)
2~<6岁	19	33804 (26787-42224)	46784 (37531-61870)
6~<16岁	84	41127 (27216-58835)	60478 (41801-82620)

※：中位值（最小值-最大值）。使用基于群体药代动力学分析软件 NONMEM[®] 的药代动力学参数的贝叶斯（Bayesian）估计值

老年人
对健康老年受试者（65岁以上）20例、健康非老年受试者6例单次静脉滴注4mg/kg^[12]，药代动力学参数如表8所示。老年受试者的AUC^[2]值为非老年受试者的1.3倍，但Cmax相近（国外人的数据）。

表 8. 老年人和非老年人药代动力学参数对比

	例数	Cmax (ng/mL)	AUC _{0-∞} (ng·hr/mL)
老年人	20	22648±4824	61334±879
非老年人	6	20490±3908	46200±4460

（测定法：LC/MS/MS）（平均值 ± 标准差）

注 1：本品已批准的成人最大用量为 600mg。
注 2：与本品已批准的成人用法用量不同。
【药理毒理】
作用机制
帕拉米韦是环戊烷类抗流感病毒药物，可结合于流感病毒神经氨酸酶的活性位点，对人类A型和B型流感病毒有抑制活性。生化分析显示帕拉米韦能抑制几种A型和B型流感病毒株的神经氨酸酶活性，对A型流感病毒株的中位IC₅₀值为0.2nM（0.09~1.4nM，n=15），对于B型流感病毒株的中位IC₅₀值为1.3nM（0.60~1.1nM，n=8），对于2009H1N1A型流感病毒株（猪流感）的IC₅₀值范围为0.06~0.26nM。
抗病毒活性：
在细胞培养试验中考察了帕拉米韦对实验室病毒株和临床分离病毒株的抗病毒活性。对季节性A型H1N1流感株的EC₅₀值为1 μM（0.09~21 μM，n=5），对A型H3N2流感株的EC₅₀值为0.07 μM（0.01~0.16 μM，n=12），对B型H3N2流感株的EC₅₀值为2.2 μM（0.06~3.2 μM，n=5）。细胞培养中的抗病毒活性、神经氨酸酶抑制活性和人体中持续流感病毒复制之间的关系尚未建立。有限的生化分析、细胞培养和动物模型数据显示帕拉米韦和奥司他韦的抗病毒活性有协同作用。尚无数据显示帕拉米韦与扎那米韦有协同作用。在鼠流感A型病毒感染模型中，帕拉米韦与奥司他韦联合用药显示抗病毒活性增强，但其临床意义尚不清楚。
耐药性：
尚无帕拉米韦耐药性的临床数据。细胞培养研究中发现，帕拉米韦耐药株流感病毒A/WSN/33（H1N1）的特征是H275Y基团。表达奥司他韦耐药相关性H275Y基团的A型H1N1临床分离株亦显示对帕拉米韦耐药。已经在使用奥司他韦的患者的2009H1N1发现了H275Y基团。至2009年9月5日，治疗和未治疗患者临床分离株的耐药率<1%。帕拉米韦的耐药途径尚未完全明确。
交叉耐药性：
在流感病毒神经氨酸酶抑制剂中已发现了交叉耐药性。在一项神经氨酸酶分析中，奥司他韦耐药药基团E119V（A/H3N2）、D198N（B）、H275Y（A/H1N1）和 R292K（H2N2）分别使对帕拉米韦的敏感性下降了1、4.8、100和80倍；扎那米韦耐药药基团E119V（H4N2）、E119D（H4N2）、E119G（H4N2）和R152K（B）分别使对帕拉米韦的敏感性下降了1、33、2和400倍。生化分析中对帕拉米韦抑制作用的敏感性于临床有效性之间的关系尚未建立。

毒理学研究
靶器官毒性：
在家兔和大鼠研究中，可见与肾相关的毒性反应，包括肌肝增加、ALT和AST增加、血液学异常（包括红细胞计数下降）。动物中观察到的毒性反应在人体易于监测。基于有限的数 据，尚未发现实验室检查异常（包括可能与帕拉米韦有关的蛋白尿和其他肾脏异常）的剂量相关性。
遗传毒性：
帕拉米韦Ames试验、CHO染色体畸变试验、小鼠微核试验结果均为阴性。
生殖毒性：
大鼠和家兔生育力及发育研究中均未见致畸作用。与人静脉注射600mg 剂量下的系统暴露量（AUC=90 μg·h/mL）相比，大鼠和家兔静脉给药帕拉米韦的暴露量分别为人的8.4倍和1.5倍。妊娠家兔静脉给予帕拉米韦200mg/kg，可导致严重的母体毒性（剂量限制性肾 病），以及与母体毒性相关的流产率增加和胚胎毒性。家兔被认为是敏感动物，在非妊娠家兔的一般毒性研究 中亦发现了肾脏毒性。与人静脉注射600mg剂量下的AUC（90 μg·h/mL）相比，非妊娠家兔肾脏毒性的安全范围小于1。在妊娠大鼠中，帕拉米韦剂量达600mg/kg未导致明显的母体毒性或胚胎毒性。
大鼠在妊娠第6至17天，经静脉连续输注帕拉米韦24h，剂量为50、400、1000mg/kg/日，每日1次。与帕拉米韦有关的主要毒性反应为胎仔乳头缩小、输尿管扩张和巨输尿管症。

【贮藏】
避光，密闭，不超过 25℃保存。
【包装】
中性硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用覆聚乙 烯四氟乙烯膜溴化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装。10 瓶/盒。
【有效期】
24 个月
【执行标准】
国家药品监督管理局药品注册标准编号 YBH01022024
【批准文号】
国药准字 H2043128
【上市许可持有人】
名 称：山东新华制药股份有限公司
注册地址：淄博市高新技术开发区化区化工区
邮政编码：255000
电话号码：0533-2166666
电 真：0533-2184991
网 址：www.xhzy.com
【生产企业】
企业名称：江苏迪赛诺制药有限公司
生产地址：江苏省溧阳经济开发区康安路 3 号
邮政编码：213300
电话号码：0519-87302019
传真号码：0519-87308510
网 址：www.jsdesano.com

190.0 mm

190.0 mm

品 名	帕拉米韦注射液说明书 20240712	规格	260X190
设计人	麦点彩印	时间	24.7.22
审核人		时间	
审核人		时间	
批准人		时间	
材 料			

c
m
k