

核准日期:2024年06月18日
修改日期:2024年07月22日
修改日期:2024年08月20日

帕拉米韦注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

**警告:本品治疗时,应谨慎考虑本品的必要性。
本品预防给药的有效性和安全性尚未确定**

【药品名称】

通用名称:帕拉米韦注射液

英文名称:Peramivir Injection


汉语拼音:Palamiveli Zhushuye

【成份】

本品活性成份为帕拉米韦。

化学名称:[(1S,2S,3R,4R)-3-[(S)-1-乙氨基-2-乙基丁基]-4-氨基-2-羧基环戊烷-1-羧酸三水合物

化学结构式:



分子式:C₁₅H₂₈N₄O₄·3H₂O

分子量:382.45

辅料:氯化钠、注射用水。

【性状】

本品为无色的澄明液体。

【适应症】

用于甲型或乙型流行性感冒。

【规格】

60mL:0.3g (按C₁₅H₂₈N₄O₄计)

【用法用量】

成人:常用剂量为每次帕拉米韦300mg,经15分钟以上单次静脉滴注。

对于因并发症等病情可能会加重的患者,剂量为每日一次600mg并经15分钟以上单次静脉滴注,根据症状可连续多日重复给药。此外,根据年龄及症状可酌情减量。

儿童:常用剂量为每日一次帕拉米韦10mg/kg,经15分钟以上单次静脉滴注,根据症状可连续多日重复给药。每次剂量不得超过600mg。

用法用量方面的使用注意事项:

1. 出现症状后,最好尽快使用本品开始治疗。对于出现症状超过48小时后才开始治疗的患者,尚未获得证明本品有效性的数据。

2. 根据体温等临床症状判断需要继续用药的情况下才可以重复给药,不可盲目地持续治疗。此外,3日以上重复给药的应用经验有限。

3. 肾功能损害患者:应根据肾功能降低的程度,按下表所示相应地调整剂量。本品重复给药时,也应按下表调整剂量。

表1 肾功能损害患者剂量调整

Ccr (mL/分)	一次剂量 (mL/分)	常用剂量	病情可能加重的患者
50 ≤ Ccr	300 mg	300 mg	600 mg
30 ≤ Ccr < 50	100 mg	100 mg	200 mg
10 [※] ≤ Ccr < 30	50 mg	50 mg	100 mg

Ccr:肌酐清除率

※:对于肌酐清除率低于10mL/分的患者以及透析患者,应谨慎地调整剂量。帕拉米韦可经血液透析迅速从血浆中清除。

【不良反应】

根据国外文献报道的不良反应:

严重不良反应

1. 休克、过敏反应 (发生频率未知)

症状可见血压过低、面色苍白、出冷汗、呼吸困难、荨麻疹等。

2. 白细胞减少、中性粒细胞减少 (1~<5%)

3. 急性肝炎、肝功能损害、黄疸 (发生频率未知)

在治疗早期 (给药次日) 可见伴有AST、ALT、γ-GTP、A1-P显著升高的肝功能损害、黄疸。

4. 急性肾损害 (发生频率未知)

5. 精神神经症状 (意识障碍、谵妄、幻觉、妄想、痉挛等)、异常行为 (发生频率未知)。

尽管因果关系不明,但是感染流感时,可能会出现导致跌倒等的异常行为 (急速走路,步

履踉跄等)。

6. 肺炎 (发生频率未知)

7. 中毒性表皮坏死松解症 (TEN)、史蒂文斯-约翰孙综合征 (Stevens-Johnson综合征) (发生频率未知)

8. 血小板减少 (发生频率未知)

9. 出血性结肠炎 (发生频率未知)

10. 其他不良反应

表2 其他不良反应列表

种类/发生频率	≥1%	0.5~<1%	<0.5%	发生频率未知
皮肤	皮疹	皮疹	过敏、荨麻疹	
消化系统	腹泻 (6.3%)、恶心、呕吐	腹痛	食欲减退、腹部不适、口唇炎	
肝脏	AST升高、ALT升高	LDH升高、胆红素升高、γ-GT升高	ALP升高	
肾脏	蛋白尿、尿蛋白、血尿、尿潜血	BUN升高		
血液	淋巴细胞减少	嗜酸性粒细胞增多	血小板减少	
精神神经系统	嗜白细胞减少		眩晕、失眠	
其他	血糖升高	尿蛋白阳性、CK升高	黄视	血管疼痛

【禁忌】

对本品成分有过敏史的患者不得用药。

【注意事项】

1. 本品治疗时,应谨慎考虑本品的必要性。

• 鉴于并非所有甲型或乙型流感病毒感染患者都必须使用抗病毒药物,在本品治疗时应仔细观察患者的状态,并谨慎考虑本品治疗的必要性。

• 鉴于本品为静脉滴注制剂,应充分考虑口服制剂和吸入剂等其他抗病毒感冒药物是否可用,并研究本品治疗的必要性。

• 注意流感病毒的耐药性信息,研究使用本品治疗是否适当。

• 本品对丙型流感病毒感染没有疗效。

• 本品对细菌感染没有疗效。

作为因异常行为引起跌倒等种类的抗病毒感冒药,在感染流感时均报告有出现异常行为的症例。

患者家属说明:

• 有出现异常行为的风险。

• 在自家养病时,至少应在发烧后两天期间向护理人员等讲解防止跌倒等事故的措施。

此外,可导致跌倒等意外事故的严重异常行为为大多报告于入学后的儿童、未成年男性等,并且多发生在发烧后的两天期间。

3. 细菌感染症合并流感病毒感染时,可能会与流感样症状相混淆。对于细菌感染症以及疑似为细菌感染症时,需要给予抗菌药等进行适当处置。

4. 因在治疗早期 (如给药次日) 即可出现肝功能损害、黄疸,因此在给药后应立即密切监测患者的状态,如进行肝功能检查。

5. 因可能出现休克及过敏反应,在给药期间应在能够进行紧急治疗的状态下密切监测患者的状况。此外,即使在给药结束后也可出现休克、过敏反应,因此应予以注意。

6. 辅料成分 (氯化钠、注射用水) 可引起钠负荷及循环血容量增加,可能造成心脏负担,对于心脏、循环系统功能障碍的患者症状可能会加重。

7. 对于肾功能损害患者,应根据肌酐清除率相应地调整剂量,监测患者的状况并谨慎用药。本品为经肾排泄的药物,因此血液浓度可能会持续较高。此外,辅料成分 (氯化钠、注射用水) 容易造成水分、氯化钠过量,进而症状可能会加重。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

对孕妇或可能怀孕的女性用药时,仅可在经判断后认为治疗效益大于风险时才能用药。大鼠实验中报告本品可透过大鼠胎盘,家兔实验中有流产和早产。

对哺乳期母亲,应权衡治疗及母乳喂养的必要性,考虑继续或中止哺乳。据报告,本品可向大鼠乳汁中分泌。

【儿童用药】

尚未开展低体重出生儿、新生儿、肾功能损害儿童等人群的临床试验。

【老年用药】

在给药时应监测患者的状况。通常来说,大多数老年人的生理功能下降。

【药物相互作用】

帕拉米韦对主要的人类肝细胞色素P450 (CYP) 酶CYP1A2、2A6、2C9、2C19、2D6、2E1及3A4未显示出抑制作用,对CYP1A2、2A6、2C9、2D6及3A4未显示出诱导作用。此外,帕拉米韦不是P-糖蛋白的底物,对P-糖蛋白介导的药物转运也未显示出抑制作用 (体外试验)。

【药物过量】

据报告,本品经血液透析可迅速从血浆中清除。

【临床药理】

【血液浓度】

对健康成人男性受试者每组6例单次静脉滴注100mg、200 mg、400 mg、800 mg^{※1},血浆药物浓度变化如图1所示,单次/重复静脉滴注时的药代动力学参数如表3-4所示。C_{max}及AUC均呈剂量比例关系增加,帕拉米韦迅速被清除,平均滞留时间 (MRT) 约3小时。相比单次给药,重复给药时的药代动力学几乎没有变化,未见蓄积性。




表3 药代动力学参数									
剂量 (mg)		例数		C _{max} (ng/mL)	AUC _{0-∞} (ng·hr/mL)	CL ⁻¹ (L/hr)	MRT (hr)	V _d ^{0.5} (L)	V _d ^{0.75} (L)
100		6		11200±2900	17513±2001	5.77±0.61	2.64±0.33	15.16±2.14	
200		6		21100±1600	33895±3622	5.99±0.65	2.65±0.27	15.77±1.35	
400		6		46800±1700	63621±3620	6.41±0.92	2.44±0.28	15.53±1.71	
800		6		86200±19400	133795±12972	6.10±0.96	2.83±0.49	16.96±1.53	

表4 药代动力学参数									
剂量 (mg)		例数		C _{max} (ng/mL)	AUC _{0-∞} ⁻¹ (ng·hr/mL)	CL ⁻¹ (L/hr)	重复给药 (第6日)		
100		6		10900±2000	16486±1540	6.13±0.56			
200		6		19800±2300	30388±2380	6.64±0.49			
400		6		45300±2800	60409±5908	6.23±0.93			
800		6		85500±13100	131395±12871	6.14±0.58			

※:1.全身清除率

※:2.稳态分布容积

※:3.稳态给药期间 (24小时) 的AUC (测定法:LC/MS/MS) (平均值±标准差)

分布

人体组织分布

对健康成人男性受试者每组6例单次静脉滴注100mg、200mg、400mg、800mg^{※1},上呼吸道分泌液 (咽喉分泌液及鼻腔分泌液) 中的药物浓度随剂量相应增加。研究发现,相比于血浆,有3~9% (基于AUC) 分布到上呼吸道分泌液中。此外,400mg剂量给药时,咽喉分泌液及鼻腔分泌液中的峰浓度分别为930及1210 ng/mL。

大鼠组织分布

对大鼠单次静脉给药 [¹⁴C]-帕拉米韦24mg/kg,所有组织中的放射性浓度均在给药后5分钟达到峰浓度。此外,研究发现本品在作用部位肺及气管中分布良好,主排泄器官肾脏中观察到有较高的分布。所有组织中的放射性浓

度在给药后48小时以内降低至定量限之下,这表明组织蓄积性及残留性很低。此外,本品的脑内分布极低。

蛋白结合率

在1~100μg/mL的浓度范围内,人血清蛋白结合率 (超滤法) 为0.3~1.8% (体外试验)。

代谢

对健康成人男性受试者6例单次静脉滴注400mg,血浆及尿中未检出代谢物,仅检测到原型药物。

排泄

对健康成人男性受试者每组6例单次静脉滴注100mg、200mg、400mg、800mg^{※1},给药后48小时内的尿排泄率 (平均值) 为86.3~95.4%,6日重复给药时相对总剂量的尿中排泄率 (平均值) 为77.2~92.6%。

特殊人群

肾功能损害者

使用从日本人健康成人及流感患者以及国外健康成人、肾功能损害者及健康老年人的临床试验中获得的332例受试者及3199个血浆药物浓度数据点,进行了群体药代动力学分析。在帕拉米韦药代动力学 (CL) 的影响因子中,肾功能损害 (Ccr) 对药代动力学的影响较大,必须根据Ccr相应地调整剂量。

各肾功能损害者组中,剂量调整时 (相当于300mg) 的血浆药物浓度曲线如图2。此外,各肾功能损害者组中剂量调整时的C_{max}及AUC如表5所示。




图2 肾功能损害者组中剂量调整时 (相当于300 mg) 的血浆药物浓度曲线

表5 肾功能损害者组中剂量调整时的C_{max}及AUC[※]

	剂量 (mg/分)	C _{max} (ng/mL)	AUC (ng·hr/mL)	剂量 (mg/分)	C _{max} (ng/mL)	AUC (ng·hr/mL)
Cr<30	50	3712 (3192)	3712 (21433)	3415 (6414)	9415 (42922)	
30-50	100	7467 (9245)	87284 (33669)	14591 (18473)	173132 (67786)	
Cr=50	200	14533 (6291)	164533 (22976)	29283 (12564)	342417 (45769)	
50-80	300	21744 (11862)	60233 (41298)	54047 (37078)	119015 (83155)	
Cr=80	400	29020 (18133)	80803 (26114)	81364 (51614)	175174 (72307)	
Cr>140	600	38645 (29161)	52916 (38645)	76820 (51620)	104974 (40494)	

※:中位值 (90%预测范围),使用基于群体药代动力学分析软件NONMEM[®]的药代动力学参数的曲线结果

对22例受试者 (包括肾功能损害者) 单次静脉滴注2mg/kg^{※2},血浆药物浓度如图3所示,药代动力学参数如表6所示。随着肾功能下降,帕拉米韦从血浆中清除延迟,AUC增大 (国外人的数据)。




表6 药代动力学参数									
Ccr (mL/分)		例数		C _{max} (ng/mL)	AUC _{0-∞} (ng·hr/mL)	CL ⁻¹ (L/hr)			
Ccr < 30		5		13200±2810	137000±41300	21.1±4.58			
30 < Ccr ≤ 50		5		13700±3780	108000±31200	26.8±5.35			
50 < Ccr ≤ 80		5		12500±3500	33900±7880	77.9±21.4			
Ccr > 80		6		12800±2860	26000±3180	108 ±9.90			

(测定法:LC/MS/MS) (平均值±标准差)

对血液透析患者6例单次静脉滴注2mg/kg^{※2},血浆药物浓度如图4所示。从滴注2小时后开始进行4小时血液透析,血浆药物浓度约降低1/4 (国外人的数据)。




图4 单次给药时的血浆药物浓度 (血液透析患者)

儿科患者

对儿科患者115例 (4个月~15岁) 单次静脉滴注10mg/kg (体重60kg以上的剂量为600mg),滴注结束后4小时内的血浆药物浓度 (185个数据点) 如图5所示。此外,使用能测出血浆药物浓度的所有297个数据点进行了群体药代动力学分析,所得的药代动力学参数如表7所示。




图5 单次给药时的血浆药物浓度 (儿科患者)

表7 药代动力学参数 [※]									
		例数	C _{max} (ng/mL)	AUC _{0-∞} (ng·hr/mL)					
总体		115	38768 (23880-58835)	56569 (37531-82620)					
0 ~ <1岁		4	25848 (23880-28319)	47941 (43040-53535)					
1 ~ <2岁		8	27587 (24793-37604)	44472 (41398-52018)					
2 ~ <6岁		19	33804 (26787-42224)	46784 (37531-61870)					
6 ~ <16岁		84	41127 (27216-58835)	60478 (41801-82620)					

※:中位值 (最小值-最大值),使用基于群体药代动力学分析软件NONMEM[®]的药代动力学参数的贝叶斯 (Bayesian) 估计值

对健康老年受试者 (65岁以上) 20例、健康非老年受试者6例单次静脉滴注4mg/kg^{※2},药代动力学参数如表8所示。老年受试者的AUC_{0-∞}为非老年受试者的1.3倍,但C_{max}相近 (国外人的数据)。

表8 药代动力学参数				
	例数	C _{max} (ng/mL)	AUC _{0-12hr} (ng·hr/mL)	
老年人	20	22648±4824	61334±8793	
非老年人	6	20490±3908	46200±4460	